

Комментарии Сергея Ивановича Блинникова к семинару №5 от 30/01/2020:

On Wed, Jan 29, 2020 at 12:24 AM Рассылка семинара arXiv

<sai.arxiv@gmail.com> wrote:

>

> View this email in your browser

>

> Семинар по обзору статей на arXiv состоится в четверг 30 января в 15:00 в 48 аудитории ГАИШ.

>

> Повестка:

>

> С. Б. Попов

> Новости по быстрым радиовсплескам

>

> С. И. Блинников

> "Peak-Luminosity/Decline-Rate Relationship for Tidal Disruption Events"

(<https://arxiv.org/abs/2001.08215>)

В своём выступлении я не вполне педагогично начал с выписывания формулы для приливного разрушения через плотности звезды и средней плотности чёрной дыры. Надо было начать со школьной формулы для ускорения свободного падения

$$g = GM/R^2$$

-- это фактически ньютоновская формула для напряжённости гравитационного поля вокруг сферической массы M на расстоянии R от её центра. Здесь и ниже я все формулы пишу по модулю, хотя для строгости нужно было бы в векторных обозначениях всё писать с учётом всех знаков. Но нам ведь нужны только порядковые оценки.

Пусть M_s и R_s -- масса звезды, M_h -- масса чёрной дыры, тогда при разности расстояний dR от ЧД приливное ускорение есть

$$dg = (dg/dR)dR = GM_h * dR / R^3$$

-- опять пишу по модулю и двойкой в порядковых оценках пренебрегаю (не надо забывать и про то, что при приближении R к радиусу Шварцшильда R_g ньютоновы формулы уже вносят большие ошибки). Теперь сравним приливное dg с гравитационным полем звезды GM_s/R_s^2 .

Если

$$dg > GM_s/R_s^2,$$

то звезда разрушается приливом. Подставив в качестве dR поперечник звезды, и опять отбросив двойку, имеем условие

$$GM_h * R_s / R^3 > GM_s / R_s^2$$

и, сократив на G , имеем

$$M_h / R^3 > M_s / R_s^3, \text{ т.е.}$$

$$\rho_{\text{ЧД}} > \rho_{\text{звезды}}$$

как условие приливного разрушения. Здесь $\rho_{\text{ЧД}}$ -- плотность размазанная по всему объёму с радиусом R . Но если R приближается к R_g , то приливной эффект становится самым сильным. Поэтому R_g можно подставлять сюда для оценки самого сильного эффекта прилива. Для дыр с массами в миллиарды M_{sun} прилив совсем слабый, потому что максимальная $\rho_{\text{ЧД}}$ падает как $M_h/R_g^3 \propto 1/M_h^2$. Из простой формулы $\rho_{\text{ЧД}} > \rho_{\text{звезды}}$ сразу же видно, что при одной и той же массе в $1 M_{\text{sun}}$ оболочку красного гиганта с его малой средней плотностью разрушить приливом гораздо легче, чем белый карлик, и тем более чем нейтронную звезду.

>

> Г. В. Липунова

> "The spectral evolution of disc dominated tidal disruption events"

(<https://arxiv.org/abs/1912.06577>) "High-energy astrophysical neutrinos are produced in central parsec-scale regions of radio-bright active galaxies" (<https://arxiv.org/abs/2001.00930>)

Здесь я упоминал работы по обнаружению сверхжесткого нейтрино от лацертиды ("блазара") на IceCube, которые произвели сенсацию:

<https://icecube.wisc.edu/news/view/586>

В рассказанной Галиной Владимировной работе 2001.00930 ссылки на правильные статьи даны:

Aartsen, M. G., et al. 2017, 2018a, Science, 361, eaat1378,

doi: 10.1126/science.aat1378

—. 2018b, Science, 361, 147, doi: 10.1126/science.aat2890

>

> А. С. Волошина

> "Physics of Eclipsing Binaries. IV. The impact of interstellar extinction on the light curves of eclipsing binaries" (<https://arxiv.org/abs/1912.09474>)

У меня с этой статьёй вышел некий конфуз в понимании. Мне кажется, что конфуза бы не случилось, если бы я сначала посмотрел статью, из их списка литературы:

Prša, A., & Zwitter, T. 2005, Ap&SS, 296, 315,

doi: 10.1007/s10509-005-4841-0

Там есть и упомянутый мной закон Карделли, который мы, конечно, используем в обработке наблюдений сверхновых. У нас ведь в сверхновых распределение энергии по спектру всё время меняется, и каждый шаг нужно сворачивать теоретические потоки с функциями пропускания широкополосных фильтров и законом экстинкции, что и было представлено в докладе Анастасии Сергеевны. Кстати, кому-то из слушателей может быть полезен сайт Петра Бакланова с богатым набором фильтров в разных системах:

<https://github.com/baklanovp/pystella>

Большое спасибо организаторам и докладчикам за столь интересный семинар, и всем - всего доброго!

Блинников Сергей Иванович